~~[illegible]~~

Observation

d'un abscés récidivant à la partie interne & inferieure de la Cuisse droite par Jean Mesnier m.e Chirurgien D'Angoulême.

Le fils ainé du s.r Rambaud âgé d'environ quatre ans lors, grand mangeur, le 27.e avril 1702, ressentit une douleur à la partie inferieure et interne de la cuisse droite; quatre jours aprés il se manifesta une petite tumeur dure; on luy fit garder le repos, le regime, avec les topiques résolutifs, néantmoins la tumeur augmenta jusques au 15.e juin suivant que la tumeur s'est un peu ramolie, où pour lors je me suis servi des topiques Emollients & maturatifs. huit jours aprés, j'ay ouvert la tumeur par une incision longue de quatre travers de doigt, d'où il en sorti une pleine palette de pus bien loüable sans odeur, lequel absés a suppuré jusques au vingtième avril 1703 qu'il fut cicatrisé. –

Le 20.e mars 1704, le même malade ressentit une douleur au même endroit de la cicatrice, où je trouvay une élevation

ARC 42 n°90

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

molle; le même jour je fis une incision au même Endroit de
La cicatrice longue de trois travers de doigt, d'où il sortit une
pleine palette de pus loüable et je l'ay pansé jusques au 18.e
aoust suivant qu'il a été gueri et bien cicatrisé. —
Le premier juillet 1705, il s'est fait une autre tumeur au
même endroit, et la cicatrice s'est r'ouverte d'elle même, et
il en est sorti une demi palette de pus, et je jugeay que la source
étoit loin, je pansay le malade jusques au 29.e dud.t mois
de juillet que L'enfant est mort hétique, et il ne sortoit sur
La fin qu'une serosité sanieuse. —
j'ay fait l'ouverture du Cadavre, j'ay commencé par fendre la
Cuisse sur une grande sonde creuse jusques à l'aine, et
Continuant à introduire la sonde creuse par dessous l'os pubis,
je l'ay poussée sans peine fort avant dans la capacité
De L'abdomen, et aprés l'avoir ouvert, j'ay trouvé la sonde
sous le muscle psoas, et j'ay trouvé le Bassin de l'abcés
à costé de la derniere vertébre des lombes, Comptant de
Bas en haut, et La moitié du Corps de la vertébre
Consommée et rongée par le pus. —

Observation

d'une jambe sphacelée et separée sans l'aide des medicamens, ny opération, par jean mesnier

Mᵉ Chirurgien d'Angoulême

—

Le 12ᵉ mars 1727, le nommé Marquais Laboureur du village des fontenelles, parroisse de Balzac à trois lieües d'angoulême, amena chés moy sa fille lors agée de onze ans, à laquelle je trouvay la jambe gauche noire comme du charbon, la peau & la chair seches, comme si elle avoit été rôtie, jusques à cinq travers de doigt au dessous du genoüil, et au genoüil et à la cuisse, la peau étoit fort naturelle, sans enflure, douleur, ny inflammation. je luy conseillay de la faire mettre à l'hôtel Dieu d'Angoulême, et qu'il falloit luy couper la jambe, comme étant pauvre, je luy fis donner une place a l'hôtel Dieu, mais le pere et la mere de cette fille la voulant laisser, elle ne voulu pas y rester; de sorte qu'ils la ramenerent dans leur maison, et trois mois aprés, un matin que cette fille à son ordinaire voulant se lever de son lit, s'ecria à son pere et à sa mere qu'elle n'avoit plus sa jambe malade, ils

ARC 42 n° 90

ACADÉMIE ... MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

trouvérent effectivement la jambe sphacelée séparée, comme
si on l'avoit coupée, la chair cicatrisée, et les deux os
couverts de peau bien ~~attachée~~, et avancée un peu au delà
du moignon, ne restant à guérir qu'un petit ulcère de
la grandeur ~~longueur~~ de l'ongle du petit doigt. ils ont fait faire
une jambe de bois à cette fille; elle marche très bien et est
fort alerte. je l'ay vüe par occasion, m'étant trouvé dans
le village. le Pere et la mère m'ont assuré n'y avoir mis
aucun medicament, que de luy laver la jambe quelquefois
avec du vin chaud. — —

N° 74. Observation

d'une petite tumeur au bras droit qui faisoit tomber en syncope, lorsqu'on la touchoit par Jean Mesnier m.e chirurgien d'Angoulême.

—

M. Desaliers cydevant conseiller au Présidial d'Angoulême, âgé d'environ 55 ans lors, me fit voir une tumeur un peu dure, de couleur violette, de la grosseur d'une grosse fève, qu'il avoit depuis dix ans à la partie moyenne et posterieure du bras droit, laquelle tumeur étoit venuë si sensible depuis deux ans qu'il tomboit en syncope, lorsque quelque chose la touchoit, et qui n'avoit point de douleur autrement. je brûlay la tumeur avec la pierre à cautère le 12.e Avril 1730; la douleur cessa aussitôt. je fis tomber l'escharre par la suppuration, il fut guéri un mois après, on luy touche la cicatrice sans douleur, et il n'en a pas ressenti du depuis. —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 42 n° 90